

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®
REGION CENTRE
POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

Bulletin technique n° 33 du 28/10/99 - 2 pages

Colza

Stade : 3-6 feuilles à 8-11 feuilles. Quelques parcelles sont à "début d'élongation".

Ravageurs

- **Charançon du bourgeon terminal** : de nouvelles captures ont été constatées dans quelques sites (voir tableau ci-dessous). Aucune capture n'a été observée à Rians, Méry es Bois, Presly (18), Réclainville, Escorpain, Yèvres (28), Mâron, Vicq/Nahon, Neuvy Pailloux (36), La Chapelle Blanche, Autrèche, Auzouer et Noyant de Touraine (37).

Le traitement contre le charançon du bourgeon terminal est urgent, s'il n'a pas encore été réalisé (à faire dans les 8-10 jours après les premières captures).

Charançons du bourgeon terminal (CBT)

Dpt	Localisation	Dates		Nbre de CBT
		1ères captures	Dernières captures	
18	Bourges	15/10	26/10	10
	Sancergues	15/10	-	5
	Vailly/Sauldre	13/10	-	27
36	La Champenoise	14/10	-	1
	Levroux	14/10	-	1
	La Châtre	12/10	-	1
	Meunet/Vatan	14/10	26/10	5
	Vouillon	22/10	-	3
	Villiers	15/10	-	1
37	Reugny	14/10	-	1
	Chaveigne	26/10	-	1
	Chambourg	26/10	-	1
41	Areines	12/10	25/10	5
45	St Loup de Gonois	10/10	26/10	8
	Gy les Nonains	27/10	-	1

- Quelques **altises** sont piégées en cuvette jaune, en petit nombre.

Pas d'intervention spécifique contre les grosses altises.

- Des **pucerons verts** sont observés dans de nombreuses parcelles d'Indre et Loire et dans le pays Fort du Cher (avec de fortes variations de l'infestation entre parcelles).

Rappel du seuil d'intervention pucerons : 20 % de pieds porteurs.

Suivi phoma

La maturité des périthèces est avancée (> 75 à 80 % sur tous les sites suivis : Azy, St Florent/Cher -18-, Fleury les Aubrais -45-) ; les projections d'ascospores sont maintenant fréquentes dès qu'il pleut suffisamment (voir tableau ci-dessus). Au champ, on observe souvent des macules sur feuilles, sur toutes variétés, avec des intensités variables.

Captures moyennes d'ascospores de Phoma (pièges passifs)

DATE DE RELEVE	21 ou 22/10	25 ou 26/10
Azy (18)	300,6	887,4
Pluie (mm)	4	18
Oizon (18) Pivots de 1 ans	177,6	-
Pluie (mm)	10	-
St Florent (18)	647,4	556,2
Pluie (mm)	8	12,5
Alluyes (28)	297	432
Pluie (mm)	8	19
Le Boullay Thierry (28)	80,4	196,2
Pluie (mm)	31	9
Ecueillé (36)	810,6	892,8
Pluie (mm)	11	15
Le Louroux (37)	157,8	1172
Pluie (mm)	8	25
Selommes (41)	146,4	493,8
Pluie (mm)	8	13
Fleury les Aubrais (45)	405,6	551,4
Pluie (mm)	7,5	20

Une intervention peut être nécessaire dans les parcelles en retard, en situation à risque et n'ayant pas encore reçu de traitement fongicide : stade "3-4 feuilles", croissance ralentie, sols hydromorphes (voir bulletin n° 25 du 2/9/99).

Pour info

Traitement phoma à l'automne

La persistance d'action des triazoles à la dose homologuée sur colza est variable : elle tend vers 4 semaines sur des petits colzas à 4 feuilles ; sur des colzas vigoureux, poussant rapidement, à 6-8 feuilles, elles est plutôt de 3 semaines (effet de "dilution" du fongicide dans le volume de végétation).

Blé

Les semis sont bien avancés dans de nombreux secteurs ; ils sont retardés dans les sites à sol hydromorphes.

Stades : levée à 3 feuilles.

Suivi JNO

A la tour à succion de Fleury les Aubrais (45), les captures de pucerons *Rhopalosiphum*



Consultez notre site Internet : **www\ srpv-centre.com**
Vous y trouverez les Avertissements Agricoles, ainsi que la présentation de notre service.
Notre mél : **srpv1@terre-net.fr**



Colza
Traitement contre le **charançon du bourgeon terminal.**

Céréales
Risque **"limace"** important.

D.R.A.F. CENTRE
Service Régional de la Protection des Végétaux
93, rue de Curambourg
BP 43210
45403 Fleury les Aubrais
Tél. 02.38.22.11.11
Fax 02.38.84.19.79
Mél : srpv1@terre-net.fr
www\srpv-centre.com

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la Région CENTRE
Le Directeur-Gérant : M. HANRION
Publication périodique
C.P.P.A.P. n° 80530
ISSN n° 0757-4029
Abonnement : 325 F

padi sont très faibles. Le pouvoir virulifère des pucerons est faible. Dans les premières parcelles levées, quelques pucerons ailés commencent à être observés.

Seuil d'intervention : 10 % de plantes avec au moins un puceron ; intervenez aussi en cas de plus faibles populations présentes depuis 10 jours.

Cicadelles

Le réseau d'observation montre une activité assez importante de ces insectes dans les repousses. Les captures en parcelles levées étaients jusqu'à présent assez faibles (voir tableaux ci-dessous) car les conditions climatiques jusqu'en fin de semaine dernière étaient peu favorables à leur activité. Par contre, depuis quelques jours, le temps ensoleillé leur est favorable.

Une intervention est nécessaire dans les secteurs à risque, sur les parcelles aux stades "1 feuille encore enroulée" à "2-3 feuilles" non protégées "Gaucho" ; à partir du stade "3 feuilles", le risque d'attaque diminue fortement. Pour être efficace, le traitement doit être fait aux périodes d'activité de la cicadelle (par beau temps, pas trop tôt le matin).

Piégeage de cicadelles *Psammotettix alienus* sur fonds englués

CHER	11 au 18/10	18 au 25/10
SPV-AGRI 18-EPIS CENTRE*		
Ivoy le Pré (blé 2 f)	12	0
Jussy le Chaudrier (blé 1-2 f)	26	1
Les Aix d'Angillon (blé 1-2 f)	19	3
Mornay Berry (rep. blé 3 f-tallag.)	18 *(2 larves)*	27
Pigny (blé levée)	-	7
Soye en Septaine (orge 2 f)	31	12
Soye en Septaine (blé 2 f)	3	4
Vinon (rep. blé tallage)	7	6
La Marche -58- (orge 1 f)	18	4
SPV-UCATA*		
Méry es Bois (blé 1-2 f)	8	4
Oizon (blé 1 f)	-	0
Presly (blé 1 f)	-	4
SPV-FDGEDA*		
Allouis (blé levée)	-	1
Chavannes (blé 2 f)	-	4
Rians (rep. blé tallage)	-	26
Savigny en Septaine (blé 2 f)	-	12

EURE ET LOIR	11 au 18/10	18 au 25/10
Boisgasson (orge 1 f)	7	0
SPV-SCAEL-PHILAGRO*		
Bailleau L'Evêque (blé)	3 *(2 larves)*	1
Epernon (blé 1 f)	13	4
Ouarville (rep. Blé tallage)	21	7
Rouvray St Florentin (blé 1-2 f)	31 *(3 larves)*	3
St Pellerin (blé levée)	-	0
Villeneuve St Nicolas (blé 1 f)	24	0

INDRE	11 au 18/10	18 au 25/10
Luçay le Mâle (rep. blé)	-	0
SPV-IM'MEDIA*		
Douadic (blé 1 f)	5	3
Issoudun (blé levée)	13	0
Levroux (blé 1 f)	0	0
Mâron (seigle levée)	9	5
Neuvy Pailloux (rep. blé)	41	15
Palluau/Indre (blé 1 f)	7 *(1 larve)*	0
Segry (escourgeon 1 f)	24	4
Thizay (rep. blé tallage)	15 *(1 larve)*	20

INDRE ET LOIRE	11 au 18/10	18 au 25/10
SPV-C.A. 37*		
Azay/Cher (jachère)	1	2
Charentilly (blé 1 f)	-	3
Esvre/Indre (rep. Blé tallage)	0	6
La Roche Clermault (blé pointant)	0	1
Le Louroux (prairie)	19	7
Perrusson (fétuque)	1	1
SPV-FDGDEC 37*		
Auzouer (blé levée)	-	0
Courcoué (orge)	-	1
Noyant de Touraine (rep. blé)	-	0
SPV-BAYER*		
Reignac/Indre (orge)	6	4

LOIR ET CHER	11 au 18/10	18 au 25/10
Châteauvieux (rep. blé)	5	1
SPV-C.A. 41*		
Chambon/Cisse (rep. blé)	10	1
Courbouzon (rep. blé fin tallage)	14	8
Romilly du Perche (rep. avoine)	3	0
St Léonard en Beauce (rep. blé)	21	9
St Loup/Cher (rep. blé tallage)	7	4
Vallières les Grandes (blé 1 f)	9	3
Villerbon (rep. céréale montaison)	5	1

LOIRET	11 au 18/10	18 au 25/10
SPV-C.A. 45*		
Amilly (blé levée)	-	3
Amilly (rep. blé)	-	7
Amilly (escourgeon levée)	-	4
La Selle/le Bied (blé 1 f)	-	1
Ouzouer les Champs (rep. blé)	-	4

*Ainsi que de nombreux agriculteurs participant à l'opération